



DEPOSICIONES

Las deposiciones (heces o materia fecal) permiten la realización de diversas pruebas, químicas, citológicas y Microbiológicas, entre otras, a fin de asegurar una correcta realización respete las siguientes indicaciones.

Esta Instrucción se aplica a muestras para la realización de: Coprocultivo, Leucocitos Fecales, Antígenos en deposiciones (Rotavirus, Adenovirus ó Helicobacter pylori), sangre oculta en deposiciones, ph y Benedict

Recomendaciones Generales

Obre en un recipiente limpio, recolecte con tórula la fracción de deposición que se observe más alterada (sangre, pus, mucosidad) e introduzca en el frasco o tubo proporcionado por el Laboratorio.

FORMA EN QUE SE REALIZA EL EXAMEN

Obre en un recipiente limpio y seco (Si no dispone de uno, puede utilizar una bolsa de basura colocada bajo la tapa del WC)

Si la deposición es muy líquida obtenga el equivalente a una cucharada.

Si la deposición es sólida, colecte 1 a 2 grs. (una porción del tamaño de un poroto).

Transportar inmediatamente al Laboratorio para su procesamiento dentro de las dos horas siguientes a la toma de muestras.

Informe si está tomando antibióticos

Nota: Coprocultivo tomado con medio de transporte, o muestras de sangre en deposiciones permiten un incremento en el período de traslado de 24 horas.

Recolección de muestra de deposición desde un pañal

Para evitar la contaminación con orina, procure cambiar con frecuencia el pañal

Obtenga la muestra, en lo posible, recién emitida para evitar que sea absorbida por el pañal.

Saque con la tórula, la deposición más superficial y abundante que contenga el pañal.

Transportar inmediatamente al Laboratorio para su procesamiento dentro de las dos horas siguientes a la toma de muestras.

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones , consulte al personal del área de Toma de Muestras o consulte al servicio al cliente:

61 2248734